


Medische anamnese

Waarom doen we het eigenlijk?

Overzicht IGZ-controles

PUNT VAN AFKEURING - KRITIEK - TEKORTKOMING

Acute medische problemen, EHBO, medische anamnese
Regeling intropen medische hulp : afwezig
EHBO- en reanimatiekondigheid : afwezig
Systematische medische anamnese : afwezig
Gebruik gezondheidsvragenlijst : afwezig
Er zijn geen duidelijke afspraken wanneer medische hulp wordt ingeroepen. De inspectie acht het raadzaam dat in de praktijk informatie aan de muur worden gehangen met wat te doen bij acute medische problemen. Het is ook onduidelijk of er een noodkoffier in de praktijk aanwezig is.
Er is geen gezondheidsanamnese formulier in de praktijk aanwezig.

www.medicatieoverdracht.nl

RICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN

Opgesteld door:
Actiz, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NMG, NICTIZ, NIPCF, NVZ, NVZA, Oede, V&VN, Verenso en ZNL, IGZ en VWS zijn insteekbureaus en aanjagers van de richtlijn. De FNT, NMT, en VGN zijn later aangesloten.

25 april 2008
Status: definitief

- Bij elk contact met een voorschrijver is er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar waarop het medisch handelen wordt gebaseerd.
- Bij een spoedopname is er zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur, een actueel medicatieoverzicht beschikbaar.
- Bij overdracht naar de volgende schakel is zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker binnen 24 uur, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar.

Doel van medische anamnese:

Opsporen MTI =
Medisch
Tandheelkundige
Interactie
Tandheelkundig
Medische Interactie (TMI)



Wat is het belang van deze ziekte/deze medicijnen voor de behandeling bij de mondhygiënist?

MTI

- Ziekte of behandeling ervan geeft verschijnselen in de mond
- Ziekte verslechtert door tandheelkundige behandeling (of door een gebrek hieraan = TMI)
- Ziekte noopt tot voorzorgsmaatregelen vóór ingrepen in de mond
- Kans op acute medische situaties

Ziekte geeft orale verschijnselen




Ontregelde suikerziekte

Behandeling geeft verschijnselen in de mond



Bijwerking van medicijn voor epilepsie

Ziekte verslechtert door tandheelkundige behandeling



Ziekte verslechtert door gebrek aan tandheelkundige behandeling



Relatie parodontitis en hart- en vaatziekten?

Ziekte verslechtert door gebrek aan tandheelkundige behandeling



Relatie paro en vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht?

Kans op acute medische situaties



Doel van medische anamnese duidelijk.....


....maar hoe geven we dit vorm?

Ziekte noopt tot voorzorgsmaatregelen

- Antibiotica profylaxe ter preventie van endocarditis
- Antibiotica profylaxe bij kunstgewrichten
- Antistollings beleid

Endocarditis profylaxe 2008

www.hartstichting.nl



Kunsthartkleppen



Healthy heart valve

Damaged valve with bacterial growth

© Mass Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

I Ingrepen in de mondholte waarbij profylaxe is geïndiceerd*

1. Alle tandheelkundige/mondhygiënische behandelingen waarbij het **analyseer** wordt **geïmpandeerd**
2. Alle overdrachtbehandelingen waarbij met het instrumentarium door het foramen apicale wordt gegaan
3. Alle extracties of verwijdering van wortelresten
4. Alle operatieve ingrepen in de mond
 - a. Kaakchirurgische ingrepen, inclusief abscisies
 - b. Parodontale chirurgie
 - c. Operatieve ingrepen ten behoeve van implantaten, inclusief botkokers ten behoeve van orthodontische behandelingen

Endocarditis profylaxe is NIET geïndiceerd bij:

1. Het geven van locale anesthesie
2. Het nemen van intra-orale röntgenfoto's (standfilms, occlusale opnames)
3. Het aanbrengen, aanpassen of verwijderen van orthodontische apparatuur (plaatapparatuur en vaste apparatuur)
4. Natuurlijke sieraal van melk (gebitelementen)
5. Optreden van bloeding van lippen of orale mucosa door een trauma

Patiënten met kunstgewricht

Totale Heupprothese

INITIATIEF
Nieuw Nederlandsche Heupprothese Vereniging

IN SAMENWERKING MET
Koninklijke Geneeskundige Maatschappij
Nederlandsche Vereniging voor Aandachtelijke
Fysiotherapeutenvereniging
Postma- en Loosdrechtse Vereniging

MET ONDERSTEUNING VAN
Onderzoeksinstituut Spinoza

FINANCIERING
De ontwikkelingskosten voor de Heupprothese worden
financierd door Spinoza (2010).

Waar zijn orthopeden bang voor?

Wel of geen AB bij kunstgewrichten?

Consensus 2010
www.orthopeden.org

Beleid bij ingrepen in de mondholte? Bij wie?

Geen AB bij schroeven, pennen of platen

Geen AB bij **gezonde** patiënten met kunstgewricht

Wel AB bij **risicopatiënten** met kunstgewricht (heup of knie of schouder) (tot 2 jaar na operatie):

Risicopatiënten

slecht ingestelde suikerziekte;
 gewrichtsontstekingen;
 reumatoïde artritis;
 gedaalde afweer door HIV, kanker of
 medicijnen;
 boven 80 jaar;
 als kunstgewricht al een keer vervangen is;
 hemofilie

Beleid bij ingrepen in de mondholte? Wanneer?

Net als bij endocarditis profylaxe:
 Bij bloedige ingrepen in de mondholte
 Vooral bij ingrepen in geïnfecteerd gebied (?)

Beleid bij ingrepen in de mondholte? Waarmee?

Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®)
 2 x 500/125 mg 1 uur voor de ingreep
Bij allergie voor peniciline: clindamycine?
 Kort voor de ingreep 2 minuten spoelen met
 Chloorhexidine 0,2%

NB: Focus op gezonde mond voordat gewricht
 geplaatst?

Antitrombotica



Medicatie bij de mondhygiënist

Kans op bloedingcomplicaties
 - orale antitrombotica/antistolling

www.nmt.nl



LESA
 Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

Antistollingsbeleid

ACTA richtlijn 2010
www.acta.nl

ACTA richtlijn 2010

- Mondhygiënist stelt bloedige ingreep voor aan patiënt
- Subgingivale gebitsreiniging (*inclusief scalen en rootplanen*)

Patiënt gebruikt 1 TAR: acetylsalicylzuur/Ascal®/Persantin®/Plavix®:

Ingrep kan plaatsvinden zonder aanpassing medicatie



Patiënt gebruikt Ascal® plus Plavix®:


Overleg met voorschrijver
Ingrep kan meestal plaatsvinden zonder aanpassing medicatie



Patiënt gebruikt orale antistolling (acenocoumarol/fenprocoumon)

Patiënt neemt enkele dagen voor ingreep contact op met trombosedienst

- INR wordt bepaald 24 uur voor de ingreep
- Patiënt krijgt recept voor 5% tranexaminezuur mondspoeling (van tandarts of trombosedienst-arts)



Als INR <3,5: simpele ingreep kan plaatsvinden
Als INR >3,5: trombosedienst past zo mogelijk dosering aan



Belangrijk!

Mondhygiënist doet ingreep zo voorzichtig mogelijk
Doe de ingreep eventueel per kwadrant
Patiënt wacht in wachtkamer tot bloeding is gestopt
Mondhygiënist geeft patiënt mondelinge en schriftelijke instructies

- Geen alcohol, niet roken, warm koud eten, wat te doen bij 'stolsels in de mond'

Bij acenocoumarol/fenprocoumon: Patiënt start 1 uur na ingreep met mondspoeling tranexaminezuur: 4 dd 10 ml gedurende 5 dagen. NIET inslikken, zachtjes spoelen.

Alleen paracetamol als pijnstiller!

Aanbevelingen voor tandarts en mondhygiënist

- Medische anamnese bij elke patiënt
- Jaarlijks bijwerken in dossier
- Voor elke invasieve ingreep of voorschrijven medicatie: recente medicatie-uitdraai opvragen bij apotheek
- MTI vraag stellen!
- Handel volgens de beschikbare richtlijnen

Feelings HOW DO YOU FEEL?

shut	happy	sad	mad
worried	love	scared	confused
crazy	disappointed	dirty	embarrassed
nauseous	hungry	sick	worried



Vragen?

d.v.diermen@acta.nl